

БАЦИТУРИН, ж., титр не менее 4 млрд спор/мл

Биологический препарат для защиты овощных культур и картофеля от вредителей
ТУ ВУ 300042160.007-2006



Вредитель	Биологическая эффективность, %
Паутинный клещ	79-100
Колорадский жук	87
Морковная листовлошка	77-86
Капустная белянка	84
Репная белянка	73
Капустная совка	62
Капустная моль	81



Регламент применения

Культура	Вредный объект	Способ, время обработки	Норма расхода, л/га	Кратность обработок
Картофель	Колорадский жук (личинки 1-2 возраста)	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. 2 обработки с интервалом 7-8 дней против каждого поколения вредителя	3	2
Морковь	Морковная листовлошка	Опрыскивание в период вегетации. 2 обработки с интервалом 10 дней	3	2
Капуста	Капустная и репная белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя.	3	2-3
Огурец защищённого грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 1-2%-ной рабочей жидкостью с интервалом 5-8 дней	12-30	2-3

Разработчик: РУП «Институт защиты растений»

Изготовитель: ООО «Центр инновационных технологий»