

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ИЮЛЯ 2025 Г.

В южных регионах и на территории Минской области в агроценозах кукурузы отмечен активный лет имаго стеблевого кукурузного мотылька. При ночной температуре воздуха +17 °С и выше – ожидается массовая яйцекладка. Рекомендовано проводить учеты (с 4-го до 8–9 листа культуры) и при ЭПВ (1–2 яйцекладки/100 растений при возделывании на зерно, 2–3 шт./100 растений – при возделывании на зеленую массу) планировать инсектицидную обработку одним из зарегистрированных в «Государственном реестре...» препаратов.

При полегании посевов сельскохозяйственных культур возможна вегетация многолетних и однолетних видов сорных растений, а также прорастание зерна, что усложнит уборку зерновых, зернобобовых и других культур. В таких условиях рекомендуется предуборочное подсушивание посевов гербицидами группы глифосатов и десикантами.

Церкоспороз в посевах сахарной свеклы наиболее вредоносен при сочетании высоких температур с периодами высокой влажности летом. Проявление симптомов пятнистости может наблюдаться с начала июля и до начала сентября, что является сигналом для применения фунгицидов.

После уборки зерновых культур необходимо применение глифосатсодержащих гербицидов (пырей должен иметь 3–4 активно ассимилирующих листа (10–20 см), осоты – 4–5 листьев (диаметр розетки 10–20 см)).

В связи со сложившимися погодными условиями (большое количество осадков и умеренные температуры воздуха) наблюдается массовое поражение посадок картофеля фитофторозом и отмечаются признаки поражения альтернариозом. Необходимо продолжать фунгицидные обработки в соответствии с регламентом применения препаратов. Требуется проведение мониторинга колорадского жука и при заселенности картофеля выше (ЭПВ: 8–16 личинок 2–3 возраста/обследованное растение) – планирование защитных мероприятий.

В настоящий момент в посадках капусты наблюдается активное развитие популяций чешуекрылых вредителей. Перечень рекомендованных препаратов для контроля численности капустной моли, капустной совки, капустной и репной белянок представлен в «Государственном реестре средств защиты растений...».

Влажные погодные условия способствуют развитию болезней овощных культур (капуста, морковь, свекла, лук и др.), что требует постоянного мониторинга и внесение фунгицидов по первым признакам болезней.

Материал подготовили: А.А. Запрудский, Е.А. Якимович