О ПРИМЕНЕНИИ ФУНГИЦИДОВ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

В осенний период на озимых зерновых культурах может встречаться поражение мучнистой росой, септориозом, ринхоспориозом, сетчатой пятнистостью, видами ржавчины.

1. При единичных признаках поражения применение фунгицида нецелесообразно.

2. Критерием для применения фунгицида в осенний период является распространенность болезни (процент пораженных растений) 50 % и более на растениях в фазе кущения и степень поражения всего растения не менее 10–15 %.

3. Хотелось бы отметить, что фунгицидная обработка в осенний период может быть экономически нецелесообразной, т.е. затраты на применение фунгицида не всегда окупятся величиной сохраненного урожая.

4. В случае принятия решения о проведении обработки осенью следует соблюдать температурный режим применения препаратов. Опрыскивание проводят при температуре воздуха не менее 10–12 °С.

5. На полях с ранними сроками сева, особенно озимого ячменя, наблюдается интенсивное развитие растений и соответственно возрастает риск плохой перезимовки вследствие вымерзания, выпревания и других факторов неинфекционной природы.

В этом случае применение фунгицида в осенний период не является залогом повышения зимостойкости растений.

Рекомендации подготовили:
Крупенько Н.А., заведующий лабораторией фитопатологии
Жуковский А.Г., первый заместитель директора